

*Холбутаев У.Х.
старший преподаватель
Хайдарова М.У.
студент
кафедра «Экология и охрана окружающей среды»
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г.Джизак*

ОЦЕНКА ВОДНОГО БАЛАНСА АЙДАРО-АРНАСАЙСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Аннотация: Важным является анализ, проработка и внедрение различных вариантов регулирования водно-солевого баланса различных частей озерной системы. Результаты показывают, что минерализация коллекторно-дренажных вод значительно ниже минерализации основных водных масс ААСО, и эти воды могут использоваться для стабилизации гидрохимического состояния озерной системы.

Ключевые слова: экосистема, климат, фактор, озера, водохранилища, температура, воздух, атмосфера, свойства, уровень, ихтиофауна, рыба.

*Kholbutaev U.Kh.
senior lecturer
Khaidarova M.U.
student
department "Ecology and environmental protection"
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan, Jizzakh*

ASSESSMENT OF THE WATER BALANCE OF THE AIDAR- ARNASAY LAKE SYSTEM AND ITS IMPACT ON THE HYDROCHEMICAL REGIME

Annotation: It is important to analyze, study and implement various options for regulating the water-salt balance of various parts of the lake system. The results show that the salinity of the collector-drainage waters is significantly lower than the salinity of the main water masses of the AASO, and these waters can be used to stabilize the hydrochemical state of the lake system.

Key words: ecosystem, climate, factor, lakes, reservoirs, temperature, air, atmosphere, properties, level, ichthyofauna, fish.

Охрана водных ресурсов является трудоемким процессом, требующим решения многочисленных и сложных задач, одной из которых является комплексная оценка гидрологического и гидрохимического состояния антропогенных гидроэкосистем.

В данной работе основной акцент направлен на выявление современных особенностей формирования режима крупнейшей Айдаро-Арнасайской системы озер Узбекистана, и путей сохранения на них благоприятной экологической ситуации.

Айдаро-Арнасайская система озер (включающая озера Айдаркуль, Тузкан и Арнасайское водохранилище) расположена в 250 километрах от Ташкента, в среднем течении р. Сырдарьи, южнее Чардаринского водохранилища, на территории Джизакского и Навоийского вилоятов Республики Узбекистан. Эта водная система образовалась в середине XX века и в последние годы в своем развитии прошла ряд периодов, особенности которых определялись направлением и уровнем хозяйственной деятельности на их водосборе.

В настоящее время площадь водной поверхности превышает 3400 км², а объем 38 км³. Анализ космических снимков района ААСО за разные годы, выявил не только изменения размеров и конфигурации акватории озер, постепенное зарастание водоема влаголюбивой растительностью, но и заметное влияние водоемов на прибрежную растительность.

В 2008 году Айдаро-Арнасайская система озер включена в Рамсарский список водно-болотных угодий и получила статус международного значения. Озерная система является местом естественного воспроизводства десятков видов рыб, гнездования и обитания большого количества птиц, таких как кряква, огарь, красноголовый и красноносый нырок, серый гусь, пеликан, кулик, цапля, лебедь, баклан и многих других. В камышовых и тугайных зарослях обитают фазаны, кабаны, шакалы, барсуки, камышовые и степные коты и другие животные.

Составляющими приходной части водного баланса Арнасайской озерной системы являются речная вода, поступающая из Чардаринского водохранилища, коллекторно-дренажные воды, сбрасываемые в озерные понижения, атмосферные осадки, выпадающие на водное зеркало озер и грунтовые воды, непосредственно поступающие в Арнасайские озера.

Расходную часть водного баланса Айдаро-Арнасайской озерной системы составляют испарение с водной поверхности озерных систем. Вода, забираемая из Арнасайского водохранилища для орошения прилегающих сельскохозяйственных площадей и подземный отток из озерной системы. Помимо испарения с открытой водной поверхности, для озер интенсивно.

Площади открытой водной поверхности ААСО (сентябрь 2019 года)
таблица №1

Водоем	Площадь водной поверхности, га	Площадь ветланда, га
Чардаринское водохранилище	26186,31	4630,32
Арнасайская система озер	19724,04	10739,34
Система озер Айдаркуль и Тузкан	314817,48	28196,37
Итого	360727,83	43566,03

Бессточные озера аридной зоны, к которым относится Айдаро-Арнасайская система озер, существуют за счет устойчивой подпитки поверхностными и подземными водами.

Составляющими приходной части водного баланса Арнасайской озерной системы являются речная вода, поступающая из Чардаринского водохранилища, коллекторно-дренажные воды, сбрасываемые в озерные понижения, атмосферные осадки, выпадающие на водное зеркало озер и грунтовые воды, непосредственно поступающие в Арнасайские озера.

Расходную часть водного баланса Айдаро-Арнасайской озерной системы составляют испарение с водной поверхности озерных систем. Вода, забираемая из Арнасайского водохранилища для орошения прилегающих сельскохозяйственных площадей и подземный отток из озерной системы. Помимо испарения с открытой водной поверхности, для озер интенсивно зарастающих влаголюбивой растительностью большое значение имеет транспирация, зависящая как от метеорологических условий, так и от вида, высоты и густоты растительности.

Для мелководных озер, расположенных в пустынной зоне, где максимальные значения температуры воды в летний период достигают 30°, характерна высокая испаряемость. Исследования САНИГМИ показывают, что величина испарения зависит от морфологии котловин, соотношения мелководных и глубоководных площадей, степени зарастаемости и изменяется от 1300 мм (для восточного плеса озера Айдаркуль) до 1500 мм (для Восточно-Арнасайских озер). В целом, испарение в расчетах принималось как среднемноголетняя величина, приведенная к морфометрическим характеристикам озер. Средняя величина испарения для всей озерной системы принята в 1300 мм. Современная соленость воды в озерах в пределах 8-12 г/л и практически не сказывается на интенсивности испарения. На основании этих данных, с учетом площадей водной поверхности, рассчитывалась годовая величина потерь на испарение, которая составляет от 4 до 4,7 км³ в год.

Водный баланс Айдаро-Арнасайской озерной системы, составленный за период 2000-2010 годы показывает, что в период с 2006 по 2010 годы водный баланс оставался отрицательным, т.е. за этот период

расходная часть была больше приходной. Это связано с резким сокращением сбросов воды из Чардарьинского водохранилища, начавшимся в 2006 году. (рис. 2). При этом, в этот же период, увеличился сброс КДС в озерную систему с 1800 млн. м³ до 2600 млн. м³. Увеличение объема сброса КДС в озерную систему предотвратило резкий спад уровня воды в озерах и резкое уменьшение общего объема воды в ААСО.

В целом повышенные невязки водного баланса указывают на недостаточную точность современной системы мониторинга озер.

В настоящее время на озерной системе, которая является одним из крупнейших рыбохозяйственных водоемов Узбекистана, имеющего важное природоформирующее значение, не только для Джизакской и Навоийской областей, но и для всей нашей страны в целом, складывается неблагоприятная ситуация, требующая принятия своевременных решений на высоком уровне.

Эта оценка получена на основе результатов комплексного экспедиционного обследования водоема, осуществленного в период с 21 сентября по 5 октября 2011 года Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы совместно с НИЦ МКВК и участием института Зоологии АН Республики Узбекистан.

Анализ современного состояния Айдаро-Арнасайской озерной системы, выполненный по материалам экспедиционного обследования показал, что начавшаяся с 2005 года фаза снижения уровня воды водоемов и сложившийся на озерах характер водопользования, сопровождаются явными признаками ухудшения экологического состояния водоемов и прилегающих территорий. Оно характеризуется постепенным ростом минерализации воды озер, снижением рыбопродуктивности, формированием деградированных участков осушенного дна и осолонением побережья.

Выполненные наблюдения показали, что на большей части акватории озерной системы минерализация воды превысила 10 г/л. Согласно химических анализов, выполненных в сертифицированной лаборатории АНИДИ, в летне-осенний период 2011 года, минерализация воды в центральном плесе озера Айдаркуль составляла 10,2 г/л.

В западной оконечности озера она возросла до 10,5 г/л, а в восточной оконечности озера Айдаркуль составляла порядка 10 г/л.

В Арнасайских озерах на границе с Айдаркулем соленость воды составляла 9,8 г/л, в центре озера Тузкан 9,5 г/л, а в восточной его части, вблизи зоны влияния коллекторов Кылы и Акбулак, минерализация воды, достигала 8,8 г/л. Наименьшая минерализация характерна для Арнасайского водохранилища (1,5 г/л), однако в новых, присоединенных в 2010 году к водохранилищу южных плесах, минерализация в водохранилище составила 5 г/л. В водоемах с грунтовым питанием

соленость в летний период составляла до 50 г/л, а в солончаках, в районе ААСО, превышала 200 г/л.

В сложившейся ситуации, адекватным решением вопросов, связанных с повышением эффективности использования водных ресурсов водоемов, может стать создание Ассоциации водопользователей (арендаторов) ААСО, основная задача которой будет заключаться в создании и усилении тесного, совместного сотрудничества всех заинтересованных сторон, налаживании зарыбления водоема, проведении интродукционных и мелиоративных работ на водоемах и прилегающей территории.

Важным является анализ, проработка и внедрение различных вариантов регулирования водно-солевого баланса различных частей озерной системы. Результаты показывают, что минерализация коллекторно-дренажных вод значительно ниже минерализации основных водных масс ААСО, и эти воды могут использоваться для стабилизации гидрохимического состояния озерной системы. Одним из вариантов может послужить строительство дамбы с водовыпуском между озерами Айдаркуль и Тузкан, которая позволит значительно распредить озеро Тузкан, создать на нем эффективные предприятия рыболовства и рыбоводства. Обеспечить соответствующий контроль экологического состояния этих территорий. Усилить работы по зарыблению водоемов промысловыми видами перспективными в современных условиях и перспективе.

Использованные источники:

1. Горелкин Н.Е. Никитин А.М. Водный баланс Арнасайской озерной системы // Тр. САРНИГМИ 1976. -Вып. 39 (120). -С. 76-93.
2. Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности проведенных водоохранных мероприятий на территории деятельности Главгидромета за 2007 год. Ч. 1. - Ташкент, 2008.
3. Экспедиционное обследование Айдаро-Арнасайской системы озер в период с 21 сентября по 5 октября 2011 года. Отчет. НИЦ МКВК, Госкомприроды, Институт зоологии АН РУз. Ташкент 2011.